



البرنامج الوطني للتلقيح ضد مرض المكورات السحائية «سي» (Meningococcal C)

أسئلة وأجوبة

ورقة معلومات للأهالي

(تم تحديث تلك المعلومات في
تشرين أول / أكتوبر 2003)

IMMUNISE
AUSTRALIA PROGRAM

معلومات إضافية

ستكون هناك اختلافات بسيطة في طريقة تنفيذ البرنامج الوطني للتلقيح ضد مرض المكورات السحائية «سي» للأطفال بين سن 6 سنوات و19 سنة في ولايتك أو مقاطعتك. للمزيد من المعلومات عليك الاتصال بدائرة الصحة في ولايتك أو مقاطعتك:

الولاية/المقاطعة	رقم الاتصال
مقاطعة العاصمة الأسترالية	6205 2300 (02)
نيو ساوث ويلز	وحدة الصحة العامة (أنظر تحت كلمة «الصحة» في دليل الهاتف الأبيض)
المقاطعة الشمالية	8922 8044 (08)
كوينزلاند	3234 1500 (07)
جنوب أستراليا	8226 7177 (08)
تازمانيا	6233 3762 (03) أو 1800 671 738 (تازمانيا فقط)
فيكتوريا	9637 4144 (03)
غرب أستراليا	9321 1312 (08)

للمزيد من المعلومات العامة عن البرنامج الوطني للتلقيح ضد مرض المكورات السحائية «سي» تفضل بزيارة موقع «تحصين أستراليا» على شبكة الإنترنت على العنوان www.immunise.health.gov.au أو اتصل بخط التحصين المباشر على الرقم 1800 671 811.

جهات مفيدة للاتصال:

طبيبك:

قسم الطوارئ في المستشفى المحلي:

في حالات الطوارئ اتصل على الرقم 000 (أو 112 من هواتف الموبايل):

مرض المكورات السحائية - الأعراض

إن الشخص الذي تبدو عليه أعراض مرض المكورات السحائية الأولية قد لا تظهر عليه كل هذه الأعراض، كما أنها قد لا تظهر جميعها معاً:

- ارتفاع الحرارة بصورة مفاجئة
- صداع شديد
- نعاس أو تشوش أو فقدان الوعي
- تيبس الرقبة وآلام في المفاصل
- ظهور بقع حمراء أرجوانية أو كدمات على شكل طفح
- عدم الراحة في الأضواء القوية
- التقيؤ

وهناك أعراض أخرى يجب الانتباه إليها عند الأطفال:

- التملل
- البكاء بصوت أنين مرتفع
- صعوبة في إيقاظ الطفل
- رفض تناول الطعام
- شحوب الجلد أو تبقّعه.

ما هو البرنامج الوطني للتلقيح ضد مرض المكورات السحائية «سي»؟

كجزء من سعي الحكومة الأسترالية للحد من تأثير مرض المكورات السحائية «سي» على المجتمع، سيوفر البرنامج الوطني للتلقيح ضد مرض المكورات السحائية «سي» على مدى الأربع سنوات القادمة تلقيحًا مجانيًا ضد هذا المرض للأطفال والشباب بين سن عام واحد و 19 عامًا في 2003. وسيكون هذا من أكبر برامج التلقيح التي عرفتها أستراليا.

ما هو مرض المكورات السحائية؟

هذا المرض هو عدوى غير شائعة لكنها تهدد الحياة تنجم عن بكتيريا تعيش في مؤخرة الحنجرة أو الأنف في حوالي 10 في المائة من السكان في أي وقت من الأوقات. ومع أن معظم الذين يحملون هذه البكتيريا يظلون بصحة جيدة فإنه يمكن نشر العدوى إلى غيرهم من الأشخاص الذين قد يصابون بتوكل شديد في بعض الحالات.

ويمكن أن تحدث الإصابة بمرض المكورات السحائية في أي وقت من أوقات السنة، ولكنها أكثر شيوعًا خلال الشتاء والربيع. وهناك أنواع مختلفة من مرض المكورات السحائية، علمًا بأن النوعين «ب» و «سي» هما الأكثر شيوعًا في أستراليا. ويؤدي مرض المكورات السحائية «سي» إلى أكثر من نصف الوفيات الناجمة عن مرض المكورات السحائية في أستراليا.

واللقاح المستخدم في البرنامج الوطني للتلقيح ضد مرض المكورات السحائية «سي» يحمي من مرض المكورات السحائية «سي» فقط. وهناك أنواع أخرى من العدوى بالمكورات السحائية (كالعدوى الناجمة عن

النوع «ب») لا يغطيها هذا اللقاح. ولا يوجد لغاية الآن لقاح فعال ضد مرض المكورات السحائية «ب» في أستراليا. ومن المهم أن تظل منتبهًا لظهور أعراض مرض المكورات السحائية. وإذا حصلت أية أعراض يجب طلب العناية الطبية بصورة مستعجلة.

كيف تنتشر العدوى؟

تنتشر البكتيريا عبر الرذاذ الذي يخرج من الأنف أو الحنجرة عند السعال أو العطس أو البصق.

وما هو مدى سهولة الإصابة؟

على الرغم من أن البكتيريا تنتقل عبر الرذاذ فإنه ليس من السهل أن يصاب المرء بالعدوى. والسبب هو أن البكتيريا لا تستطيع الاستمرار طويلاً على قيد الحياة خارج الجسم.

من هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة؟

يمكن أن تحدث الإصابة بمرض المكورات السحائية في أية سن، غير أن إمكانية الإصابة ترتفع لدى المجموعات «العالية الخطر» التي تضم الأطفال دون سن الخامسة وما بين 15 و19 عامًا.

ماذا عليك أن تفعل إذا حدثت الأعراض؟

راجع طبيبك فوراً أو توجه إلى قسم الطوارئ في أقرب مستشفى.

وليس من السهل دائماً تشخيص المرض في البداية، لذلك فإنه إذا أعاد الطبيب أو المستشفى الشخص إلى المنزل ثم ساعات الأعراض بعد ذلك فيجب أخذ المريض مباشرة إلى أقرب مستشفى.

كيف تتم المعالجة؟

تجري معالجة المصابين بأعراض هذا المرض في المستشفى بالمضادات الحيوية. والمعالجة المبكرة بالمضادات الحيوية هي أساس إنقاذ حياة المصاب.

كيف يمكنني أن أحمي طفلي؟

هناك بعض التدابير الاحتياطية التي يمكن أن تتخذها لحماية طفلك ومنع إصابته بالمرض:

١. لقح طفلك ضد مرض المكورات السحائية «سي»، إذ أن التلقيح يوفر حماية بنسبة 90 في المائة ضد مرض المكورات السحائية «سي».
٢. إن الأولاد الذين يدخن والدوهم أكثر عرضة للإصابة بمرض المكورات السحائية «سي». لطلب المساعدة في الإقلاع عن التدخين اتصل بخط «الإقلاع» على الرقم 131 848، أو تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي الذي تتعامل معه أو تفقد الموقع www.quitnow.info.au على شبكة الإنترنت.

هل للقاح أية نتائج جانبية؟

إن لقاح مرض المكورات السحائية «سي» مأمون جداً. فهو لا يحتوي على بكتيريا حية ولا يمكن أن يؤدي إلى ظهور مرض المكورات السحائية لدى طفلك. وهناك بعض النتائج الجانبية الخفيفة التي يمكن أن تظهر على طفلك، من أكثرها شيوعاً الألم والاحمرار والورم في موضع الإبرة وارتفاع الحرارة والتلملل وفقدان الشهية والصداع. لكن هذه النتائج الجانبية لا تدوم إلا لمدة قصيرة فقط، أما النتائج الجانبية الأكثر خطورة فنادرة جداً. وعليك هنا أيضاً، كما في أية حالة أخرى، بحث موضوع النتائج الجانبية الممكن حدوثها مع المسؤول الذي يقوم بالتلقيح قبل عملية التلقيح إياها.