



National Childhood Pneumococcal Vaccination Program (Εθνικό Πρόγραμμα Πνευμονιοκοκκικού Εμβολιασμού Παιδικής Ηλικίας)

Μερικές συνήθειες ερωτήσεις και απαντήσεις

Περί του Εθνικού Προγράμματος Πνευμονιοκοκκικού Εμβολιασμού Παιδικής Ηλικίας

Προκειμένου να μειωθεί ο αντίκτυπος της πνευμονιοκοκκικής νόσου ανάμεσα σε παιδιά, η Αυστραλιανή Κυβέρνηση εγκαθίδρυσε ένα Εθνικό Πρόγραμμα Πνευμονιοκοκκικού Εμβολιασμού Παιδικής Ηλικίας που ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2005.

Το Πρόγραμμα παρέχει δωρεάν πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο μέσω του φορέα εμβολιασμού του παιδιού σας.

Ποιος έχει δικαίωμα να κάνει πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο δωρεάν;
Νήπια που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2005 έχουν δικαίωμα να κάνουν δωρεάν πνευμονιοκοκκικό συζευγμένο εμβόλιο (Prevenar®) στην ηλικία των 2, 4 και 6 μηνών μαζί με άλλα εμβόλια που είναι προγραμματισμένα για τότε.

Παιδιά που γεννήθηκαν από 1 Ιανουαρίου 2003 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2004 έχουν δικαίωμα να κάνουν δωρεάν πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο μέσω αναδρομικού προγράμματος που θα διεξάγεται το 2005. Ο αριθμός δόσεων που απαιτούνται για αναδρομικό εμβολιασμό ποικίλλει ανάλογα με την ηλικία στην οποία δόθηκε η πρώτη δόση. Ο φορέας εμβολιασμού του παιδιού σας θα σας ενημερώσει σχετικά με το πόσες δόσεις χρειάζεται το παιδί σας.

Παιδιά στις συγκεκριμένες ομάδες υψηλού κινδύνου, που δικαιούνταν δωρεάν εμβόλιο και συμπληρωματικές δόσεις [booster doses] στο πλαίσιο του στόχου του προηγούμενου προγράμματος, συνεχίζουν να δικαιούνται δωρεάν εμβόλιο. Αυτά τα παιδιά χρειάζονται πρόσθετες συμπληρωματικές δόσεις του εμβολίου, οι οποίες παρέχονται κι αυτές δωρεάν. Ο φορέας εμβολιασμού σας θα σας ενημερώσει αν το παιδί σας ανήκει σε μια συγκεκριμένη ομάδα υψηλού κινδύνου.

Τι είναι η πνευμονιοκοκκική νόσος;

Η πνευμονιοκοκκική νόσος είναι μια ενδεχομένως σοβαρή ομάδα λοιμώξεων που προκαλούνται από βακτηρίδια. Η πνευμονιοκοκκική νόσος μπορεί να οδηγήσει σε λοίμωξη γύρω από τον εγκέφαλο (μηνιγγίτιδα), λοίμωξη του αίματος (βακτηραιμία), πνευμονία, και λοιμώξεις μέσου ωτός (μέση ωτίτιδα). Σε παιδιά, η λοίμωξη μέσου ωτός είναι η πιο συνήθης λιγότερο σοβαρή μορφή πνευμονιοκοκκικής νόσου.

Τα βακτηρίδια μεταδίδονται σε σταγονίδια που εκβάλλονται από το στόμα ή τη μύτη μέσω βήχα, φτερνίσματος ή επαφής με αντικείμενα που έχουν μολυνθεί με μολυσμένα σταγονίδια. Τα πνευμονιοκοκκικά βακτηρίδια (πνευμονιόκοκκοι) απαντώνται συνήθως στο πίσω μέρος του λαιμού και στη μύτη υγιών παιδιών και ενηλίκων.

Ο χρόνος επώασης (χρόνος που απαιτείται μέχρι να προκαλέσει το μικρόβιο συμπτώματα και ενδείξεις) της νόσου μπορεί να είναι μόλις 24 ώρες.

Η σοβαρή πνευμονιοκοκκική νόσος που εμφανίζεται ως μηνιγγίτιδα σε παιδιά συχνά αρχίζει με παρόμοιο τρόπο όπως πολλές άλλες λοιμώξεις με πυρετό - το παιδί φαίνεται αδιάθετο και μπορεί να αρνηθεί να φάει ή να πει. Τα παιδιά μπορεί να είναι πολύ ήσυχια και νωθρά ή να εμφανίζουν συνεχώς δυσφορία. Τα μεγαλύτερα παιδιά μπορεί να πουν ότι έχουν πονοκέφαλο και ότι το δυνατό φως πονά τα μάτια τους (φωτοφοβία). Μικρότερα παιδιά μπορεί να αισθάνονται δυσφορία στο δυνατό φως. Η αυχενική δυσκαμψία δεν εμφανίζεται απαραίτητως αλλά σε συνδυασμό με άλλα συμπτώματα υποδεικνύει πιθανή μηνιγγίτιδα. Εξανθήματα μπορεί να εμφανιστούν σε οποιοδήποτε στάδιο και αποτελούν λόγο ανησυχίας.

Πόσο συνήθης είναι η πνευμονιοκοκκική νόσος σε παιδιά;

Η πνευμονιοκοκκική νόσος είναι πιο κοινή σε παιδιά ηλικίας κάτω των δύο ετών και ενήλικες ηλικίας 65 ετών και άνω. Τα ποσοστά της ασθένειας είναι υψηλότερα σε Αυτόχθονα παιδιά, ιδιαίτερα της κεντρικής Αυστραλίας. Ορισμένα παιδιά με παθήσεις όπως εξασθενημένη ανοσία ή χρόνια πάθηση διατρέχουν επίσης αυξημένο κίνδυνο.

Υπάρχουν 90 διαφορετικοί τύποι πνευμονιοκοκκικών βακτηριδίων. Ωστόσο, τα περισσότερα κρούσματα της νόσου προκαλούνται από λίγους μόνο τύπους αυτών των βακτηριδίων. Αν και η πνευμονιοκοκκική νόσος μπορεί να εκδηλωθεί οποιαδήποτε στιγμή, οι λοιμώξεις φαίνεται να είναι πιο συνηθισμένες κατά τη διάρκεια του χειμώνα και της άνοιξης.

Είναι η πνευμονιοκοκκική νόσος διαφορετική από την μηνιγγιτιδοκοκκική νόσο;

Ναι. Αν και τόσο η πνευμονιοκοκκική νόσος όσο και η μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος μπορούν να προκαλέσουν λοίμωξη γύρω από τον εγκέφαλο και δηλητηρίαση του αίματος, οι δύο ασθένειες προκαλούνται από δύο διαφορετικά βακτηρίδια.

Ο εμβολιασμός κατά της μηνιγγιτιδοκοκκικής C νόσου δεν θα προστατεύσει το παιδί σας από την πνευμονιοκοκκική νόσο.

Ποιο εμβόλιο χρησιμοποιείται σ' αυτό το Πρόγραμμα;

Το πνευμονιοκοκκικό συζευγμένο εμβόλιο Prevenar® χρησιμοποιείται σ' αυτό το Πρόγραμμα για ενέσεις που χορηγούνται στην ηλικία των 2, 4, και 6 μηνών και στο αναδρομικό μέρος του Προγράμματος. Το Prevenar® ενεργεί καλά σε βρέφη και μικρά παιδιά και καλύπτει τους επτά τύπους πνευμονιοκοκκικών βακτηριδίων (πνευμονιόκοκκων) που προκαλούν συνηθέστερα την ασθένεια σε παιδιά. Παιδιά σε συγκεκριμένες ομάδες υψηλού κινδύνου χρειάζονται πρόσθετες δόσεις Prevenar® ή του πνευμονιοκοκκικού εμβολίου πολυσακχαρίτη PneumoVax®23, ανάλογα με την ομάδα κινδύνου τους και την ηλικία κατά την οποία χορηγείται το εμβόλιο.

Πόσες δόσεις Prevenar® θα χρειαστεί το παιδί μου;

Αυτό εξαρτάται από την ηλικία στην οποία το παιδί σας πηγαίνει για εμβολιασμό. Μεταξύ της ηλικίας των 1 και 6 μηνών, το παιδί σας θα χρειαστεί τρεις δόσεις για να είναι πλήρως προστατευμένο. Μεταξύ της ηλικίας των 7 έως 17 μηνών, το παιδί σας θα χρειαστεί δύο δόσεις, και μεταξύ των 18 και 23 μηνών το παιδί σας χρειάζεται μόνο μια δόση Prevenar®.

Ο αριθμός δόσεων εμβολίου που χρειάζεται το παιδί σας αλλάζει με την ηλικία του επειδή καθώς μεγαλώνει το παιδί σας, το ανοσοποιητικό του σύστημα είναι πιο ικανό να ανταποκριθεί στο εμβόλιο, προστατεύοντάς το έτσι με λιγότερες δόσεις εμβολίου.

Δόσεις θα πρέπει να χορηγούνται σε διαστήματα δύο περίπου μηνών.

Υπάρχουν παρενέργειες από τη λήψη του εμβολίου;

Μπορεί να υπάρξει λίγο πρήξιμο, κοκκίνισμα και πόνος στην περιοχή της ένεσης. Το παιδί μπορεί επίσης να έχει χαμηλό πυρετό, να νυστάζει, να είναι ανήσυχος ή ευερέθιστος. Ασυνηθιστες παρενέργειες μπορεί να περιλαμβάνουν εμετό, μειωμένη όρεξη ή διάρροια. Σοβαρές αντιδράσεις είναι πολύ σπάνιες. Υπάρχει η εξαιρετικά μικρή πιθανότητα ότι το εμβόλιο, όπως οποιοδήποτε φάρμακο, θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, όπως σοβαρή αλλεργική αντίδραση. Το παιδί σας δεν μπορεί να πάθει πνευμονιοκοκκική νόσο από το εμβόλιο.

Μπορεί το παιδί μου να κάνει το εμβόλιο Prevenar® ταυτόχρονα με άλλους συνήθεις εμβολιασμούς;

Όλα τα προγραμματισμένα εμβόλια θα πρέπει να χορηγούνται στην ίδια επίσκεψη (για παράδειγμα, σε ηλικία 2 μηνών), και μπορούν να χορηγούνται συγχρόνως την ίδια ημέρα. Πολλαπλοί εμβολιασμοί δεν θα υπερφορτώνουν το ανοσοποιητικό

σύστημα. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι πολλαπλά εμβόλια που χορηγούνται ταυτοχρόνως αυξάνουν τον κίνδυνο σοβαρών ανεπιθύμητων αντιδράσεων.

Είναι ασφαλές να κάνει το παιδί μου 3 ενέσεις ταυτοχρόνως;

Το Εθνικό Συμβούλιο Υγείας και Ιατρικής Έρευνας [National Health and Medical Research Council] έχει υποδείξει ότι είναι ασφαλές και αποτελεσματικό να χορηγούνται σε παιδιά τρεις ενέσεις κατά την ίδια επίσκεψη. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η χορήγηση πολλαπλών εμβολίων στην ίδια επίσκεψη υπερφορτώνει το ανοσοποιητικό σύστημα ενός παιδιού. Για ελαχιστοποίηση της ενόχλησης, δύο ενέσεις χορηγούνται στο ένα άκρο, και η τρίτη ένεση χορηγείται στο αντίθετο άκρο. Σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 μηνών χρησιμοποιείται ο μηρός, ενώ σε παιδιά ηλικίας 12 μηνών και άνω, χρησιμοποιείται ο βραχίονας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Θα υπάρχουν δευτερεύουσες διαφορές στον τρόπο που εφαρμόζεται το Εθνικό Πρόγραμμα Πνευμονιοκοκκικού Εμβολιασμού Παιδικής Ηλικίας σε κάθε Πολιτεία και Επικράτεια. Σε πρώτο στάδιο, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το συνήθη σας φορέα εμβολιασμού για λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το υπουργείο υγείας της Πολιτείας ή Επικράτειάς σας από τους αριθμούς που αναφέρονται παρακάτω.

Πολιτεία/Επικράτεια	Αριθμός για επικοινωνία
ACT	02 6205 2300
NSW	Μονάδα Δημόσιας Υγείας [Public Health Unit] (κοιτάξτε στο 'Health' στον ονομαστικό τηλεφωνικό κατάλογο White Pages)
NT	08 8922 8044
Qld	07 3234 1500
SA	08 8226 7177
Tas	03 6222 7724 ή 1800 671 738 (Τασμανία μόνο)
Vic	1300 882 008
WA	08 9321 1312

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται από τη Γραμμή Πληροφοριών Εμβολιασμού [Immunisation Infoline] στο **1800 671 811** ή από τις ιστοσελίδες του Προγράμματος Εμβολιασμών Αυστραλίας [Immunise Australia Program] στο <http://immunise.health.gov.au/pneumococcal/index.htm>