



Australian Government
Department of Health and Ageing

National Childhood Pneumococcal Vaccination Program (Programma nazionale di vaccinazione antipneumococcica per l'infanzia)

Alcune domande e risposte comuni

Il National Childhood Pneumococcal Vaccination Program

Allo scopo di ridurre l'impatto delle malattie causate dal batterio comunemente chiamato pneumococco, il governo australiano ha varato il National Childhood Pneumococcal Vaccination Program (letteralmente "programma nazionale di vaccinazione dell'infanzia contro lo pneumococco") il quale è in vigore dal 1° gennaio 2005.

Il programma offre la vaccinazione antipneumococcica gratuita tramite gli organi incaricati dell'immunizzazione dell'infanzia.

Chi ha diritto a ricevere il vaccino antipneumococcico a titolo gratuito?

I bambini nati dopo il 1° gennaio 2005 hanno diritto a ricevere a titolo gratuito il vaccino pneumococcico coniugato (Prevenar®) all'età di 2, 4 e 6 mesi assieme ad altri vaccini la cui somministrazione è prevista per tali scadenze.

I bambini nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2004 hanno diritto al vaccino pneumococcico gratuito mediante un programma di "regolarizzazione" che opererà nel 2005. Il numero di dosi richieste per le vaccinazioni di regolarizzazione dipendone dall'età in cui viene somministrata la prima dose. L'ente responsabile dell'immunizzazione dell'infanzia vi comunicherà di quante dosi necessiterà vostro figlio.

I bambini rientranti in specifici gruppi ad alto rischio che hanno diritto al vaccino gratuito e alle dosi di richiamo ai sensi dell'apposito programma precedentemente in vigore, continueranno ad avere diritto alla vaccinazione gratuita. Tali bambini necessitano di dosi di richiamo supplementari che vengono anch'esse offerte a titolo gratuito. L'ente responsabile dell'immunizzazione dell'infanzia vi comunicherà se vostro figlio rientra in un gruppo specifico ad alto rischio.

Cosa s'intende per malattia da pneumococco?

Le malattie da pneumococco sono un gruppo di infezioni potenzialmente gravi causate da batteri. Le malattie da pneumococco possono provocare l'infezione della regione cerebrale (meningite), infezione del sangue (batteriemia), polmonite e infezioni dell'orecchio medio (otite media). Nei bambini, l'infezione dell'orecchio medio è la forma più comune di malattie da pneumococco meno gravi.

I batteri si diffondono nelle goccioline provenienti dalla bocca o dal naso quando si tossisce, starnutisce o si hanno contatti con oggetti che sono stati contaminati con le goccioline infette. I batteri pneumococcici vengono comunemente trasportati nella parte posteriore della gola e nel naso di bambini ed adulti sani.

I tempi di incubazione (ciò il tempo impiegato dal microbo per causare segni e sintomi) per le malattie da pneumococco possono essere di sole 24 ore.

Le malattie gravi da pneumococco che si manifestano come meningite nei bambini spesso iniziano con sintomi simili a molte altre infezioni accompagnate da febbre – il bambino ha un aspetto “sciupato” e potrebbe rifiutarsi di mangiare o bere. I bambini potrebbero diventare molto quieti o inattivi o sembrare continuamente irrequieti. I bambini più grandicelli potrebbero dire di avere il mal di testa e la luce vivace potrebbe far loro male agli occhi (fotofobia). I bambini più piccini potrebbero manifestare disagio se esposti a luce vivace. La rigidità nucale non è un sintomo necessariamente presente ma se abbinata ad altri sintomi potrebbe indicare meningite. In qualsiasi momento potrebbe manifestarsi un'irritazione cutanea e questo è motivo di preoccupazione.

Le malattie da pneumococco sono comuni nei bambini?

Le malattie da pneumococco sono più comuni nei bambini di età inferiore ai due anni e negli adulti che hanno compiuto 65 anni. Gli indici più alti della malattia interessano i bambini di estrazione aborigena, soprattutto quelli che vivono nell'Australia centrale. Anche alcuni bambini con disturbi medici quali un'immunità ridotta o malattie croniche presentano un rischio maggiore.

Esistono 90 tipi diversi di batteri pneumococcici. Tuttavia, la maggior parte dei casi di queste malattie è causata solo da pochi tipi di questi batteri. Anche se le malattie da pneumococco possono manifestarsi in qualsiasi momento, sembra che le infezioni siano più comuni in inverno e in primavera.

Le malattie da pneumococco sono diverse dalle infezioni da meningococco?

Sì. Anche se sia le malattie da pneumococco sia le infezioni da meningococco possono causare infezioni nella regione cerebrale e l'intossicazione del sangue, i due tipi di malattie sono provocate da due batteri diversi. La vaccinazione contro le infezioni da meningococco C non proteggerà vostro figlio dalle malattie da pneumococco.

Quale vaccino viene usato in questo programma?

Il vaccino antipneumococcico coniugato Prevenar® viene usato nell'ambito di questo programma con iniezioni praticate all'età di 2, 4 e 6 mesi e nella fase di richiamo del programma stesso. Il Prevenar® agisce efficacemente nei neonati e nei bambini più piccoli e copre i sette tipi di batteri pneumococcici che causano con maggiore frequenza malattie dell'infanzia. I bambini appartenenti a gruppi specifici ad alto rischio necessitano di dosi supplementari di Prevenar® o del vaccino antipneumococcico polisaccaride PneumoVax®23, a seconda del gruppo di rischio di appartenenza e dell'età in cui viene somministrato il vaccino.

Di quante dosi di Prevenar® avrà bisogno mio figlio?

Questo dipende dall'età in cui vostro figlio viene sottoposto all'immunizzazione. Nell'età compresa tra 1 e 6 mesi, vostro figlio avrà bisogno di tre dosi per essere del tutto protetto. Nell'età compresa tra i 7 e i 17 mesi, vostro figlio avrà bisogno di due dosi, mentre nell'età compresa tra i 18 e i 23 mesi, vostro figlio necessiterà di una sola dose di Prevenar®.

Il numero di dosi di vaccino necessarie varia a seconda dell'età di vostro figlio perché con l'aumento dell'età il suo sistema immunitario è meglio in grado di rispondere al vaccino il che consente di proteggerlo con un numero inferiore di dosi del vaccino.

Le dosi vanno somministrate a distanza di circa due mesi l'una dall'altra.

La vaccinazione comporta effetti collaterali?

Nel punto dell'iniezione potrebbero manifestarsi gonfiore, rossore e dolore al tatto. Il bambino potrebbe anche avere febbre leggera, sonnolenza o irascibilità. Effetti collaterali meno comuni potrebbero includere vomito, inappetenza o diarrea. Gravi reazioni sono assai rare. Esiste la modestissima probabilità che il vaccino, così come qualsiasi altro farmaco, possa causare disturbi gravi come, ad esempio, una reazione allergica acuta. Vostro figlio non può contrarre malattie da pneumococco dal vaccino.

Mio figlio può ricevere il vaccino Prevenar® contemporaneamente ad altre vaccinazioni di routine?

Tutte le vaccinazioni periodiche dovrebbero essere somministrate in occasione della stessa visita (ad esempio, all'età di 2 mesi), e possono essere somministrate alla stessa ora nello stesso giorno. Vaccinazioni multiple non sovraccaricheranno il sistema immunitario. Non esistono elementi a sostegno della tesi che vaccini multipli somministrati contemporaneamente facciano aumentare il rischio di gravi reazioni avverse.

È sicuro per mio figlio ricevere 3 iniezioni contemporaneamente?

Il National Health and Medical Research Council (consiglio nazionale della salute e della ricerca medica) si è pronunciato a favore della sicurezza e dell'efficacia della somministrazione ai bambini di tre iniezioni in occasione della stessa visita. Non vi sono elementi a sostegno della tesi che la somministrazione contemporanea di vaccini multipli provochi un sovraccarico a danno del sistema immunitario del bambino. Per minimizzare il disagio, due iniezioni vengono praticate in un arto mentre la terza viene praticata nell'arto opposto. Nei bambini sotto i 12 mesi di età si usa la coscia, mentre nei bambini che hanno compiuto i 12 mesi, si usa il braccio.

Maggiori informazioni

Vi saranno differenze di minore portata nel modo in cui il National Childhood Pneumococcal Vaccination Program viene attuato in ogni stato e territorio. In primo luogo, dovrete rivolgervi al medico di famiglia o al soggetto incaricato della vaccinazione per conoscere i particolari del programma. Altrimenti, potete interpellare il ministero della sanità del vostro stato o territorio di residenza ai numeri sottoelencati.

Stato/Territorio	Numero telefonico
Australian Capital Territory	02 6205 2300
New South Wales	Public Health Unit (consultate la voce 'Health' nell'elenco telefonico)
Northern Territory	08 8922 8044
Queensland	07 3234 1500
South Australia	08 8226 7177
Tasmania	03 6222 7724 o 1800 671 738 (Tasmania soltanto)
Victoria	1300 882 008
Western Australia	08 9321 1312

Maggiori informazioni si possono ottenere anche telefonando al numero verde **1800 671 811** della Immunisation Infoline oppure visitando il sito dell'Immunise Australia Program: <http://immunise.health.gov.au/pneumococcal/index.htm>