



Περισσότερες Πληροφορίες

Επικράτεια Πρωτεύουσας Αυστραλίας
ACT Πληροφοριακή Γραμμή Ανοσοποίησης
(02) 6205 2300

Νέα Νότια Ουαλία

Επικοινωνήστε με τις τοπικές Δημόσιες Μονάδες
(κοιτάξτε στο “Health” στις Λευκές σελίδες του
τηλεφωνικού καταλόγου)

Βόρεια Επικράτεια
(08) 8922 8044

Κουηνσλάνδη
(07) 3234 1500

Νότια Αυστραλία
Ανοσοποίηση Νότιας Αυστραλίας
Μονάδα Συντονισμού
(08) 8226 7177

SA (24-ώρη) Γραμμή Επικοινωνίας Βοήθειας Γονέων
[Parent Help-Line]
(Παιδική και Εφηβική Υγεία)
1300 364 100

Τασμανία
(03) 6222 7724 or
1800 671 738

Βικτώρια
1300 882 008

Δυτική Αυστραλία
(08) 9321 1312

Για να παραγγείλετε περισσότερα αντίγραφα αυτού του βιβλιαρίου τηλεφωνήστε στην Γραμμή Πληροφοριών της Ανοσοποιείστε την Αυστραλία στο **1800 671 811**

Understanding Childhood

IMMUNISATION

is proudly endorsed by



Royal Australasian
College of Physicians



Australian Divisions
of General Practice



Australian Early Childhood
Association Inc



Australian Institute of
Environmental Health



Deafness Foundation



Federation of Ethnic
Communities' Councils
of Australia



Post-Polio Network
(NSW) Inc



Rotary International



National Aboriginal
Community Controlled
Health Organisation



The PHARMACY GUILD of AUSTRALIA



Australian Government
Department of Health and Ageing

IMMUNISE

AUSTRALIA PROGRAM

An Australian, State and Territory
Governments Initiative



Greek

Η ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΣΗ

Understanding Childhood

IMMUNISATION



Πρόγραμμα Εθνικού Προγράμματος Ανοσοποίησης,
Αυστραλία (Ισχύει από 1 Νοεμβρίου 2005)

Πρόγραμμα Χρηματοδοτούμενης Ανοσοποίησης (0–4 χρόνων)

ΗΛΙΚΙΑ	ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ
Γέννηση	<ul style="list-style-type: none">● Ηπατίτιδα Β <p>Σημειώστε τον κύκλο ότι έχει ανοσοποιηθεί το παιδί σας <input type="checkbox"/></p>
2 μηνών	<ul style="list-style-type: none">● Διφθερίτιδα-Τέτανος-Κοκκύτης● Ηπατίτιδα Β● Αιμόφιλη Γρίπη τύπου β (Hib)● Πολιομυελίτιδα● Πνευμονιοκοκκική ασθένεια <input type="checkbox"/>
4 μηνών	<ul style="list-style-type: none">● Διφθερίτιδα-Τέτανος-Κοκκύτης● Ηπατίτιδα Β● Αιμόφιλη Γρίπη τύπου β (Hib)● Πολιομυελίτιδα● Πνευμονιοκοκκική ασθένεια <input type="checkbox"/>
6 μηνών	<ul style="list-style-type: none">● Διφθερίτιδα-Τέτανος-Κοκκύτης● Ηπατίτιδα Β – ή στους 12 μήνες● Αιμόφιλη Γρίπη τύπου β (Hib) (μπορεί να δοθεί ανάλογα με τον τύπο εμβολίου)● Πολιομυελίτιδα● Πνευμονιοκοκκική ασθένεια <input type="checkbox"/>
12 μηνών	<ul style="list-style-type: none">● Ηπατίτιδα Β – ή στους 6 μήνες● Αιμόφιλη Γρίπη τύπου β (Hib)● Ιλαρά-Παρωτίτιδα-Ερυθρά● Μηνιγγιτιδοκοκκική C ασθένεια <input type="checkbox"/>
18 μηνών	<ul style="list-style-type: none">● Ανεμοβλογιά <input type="checkbox"/>
4 χρόνων	<ul style="list-style-type: none">● Διφθερίτιδα-Τέτανος-Κοκκύτης● Ιλαρά-Παρωτίτιδα-Ερυθρά● Πολιομυελίτιδα <input type="checkbox"/>

*Σημείωση: Επιπρόσθετα εμβόλια χρηματοδοτούνται για παιδιά των Ιθαγενών και των νησιωτών του Torres Strait στην ΒΕ, ΔΑ, ΝΑ και Κούνσλ. Δείτε Κεφάλαιο 3, σελίδα 43 για περισσότερες λεπτομέρειες.

Για περισσότερες πληροφορίες για την ανοσοποίηση επισκεφθείτε την ιστοθέση Ανοσοποιείστε την Αυστραλία [Immunise Australia] στο <http://immunise.health.gov.au> ή τηλεφωνήστε στη Γραμμή Πληροφοριών Ανοσοποιείστε την Αυστραλία στο **1800 671 811**.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Μητρώο Ανοσοποίησης Παιδικής Ηλικίας Αυστραλίας, επισκεφθείτε την ιστοθέση του Μητρώου Ανοσοποίησης στο www.medicareaustralia.gov.au ή τηλεφωνήστε στο **1800 653 809**.

Ηπατίτιδα Β - μεταδοτικός ιός που διαδίδεται κυρίως με το αίμα, την σεξουαλική επαφή ή από τη μητέρα στο νεογέννητο μωρό° προκαλεί οξεία ηπατίτιδα ή χρόνια μεταφορά του ιού.

Περίπου 1 στους 4 χρόνιους φορείς θα αναπτύξει κίρρωση ή καρκίνο του ήπατος.

Περίπου 1 στα 15 ως 1 στα 100 άτομα έχει πόνο και πυρετό. Παρουσιάζεται αναφυλαξία (μια ξαφνική και σοβαρή αλλεργική αντίδραση που καταλήγει σε σοβαρή πτώση της πίεσης του αίματος) σε περίπου 1 στις 600.000.

Hib - μεταδοτικά βακτηρίδια που μεταδίδονται με σταγονίδια° προκαλεί μηνιγγίτιδα, επιγλωττίδα, (αναπνευστική παρεμπόδιση), σηψαιμία, οστεομυελίτιδα (μόλυνση των κοκάλων).

Περίπου 1 στους 20 ασθενείς μηνιγγίτιδας πεθαίνει και 1 στους 4 επιζώντες έχουν μόνιμη εγκεφαλική ζημία ή ζημία νεύρων. Περίπου 1 στους 100 ασθενείς επιγλωττίδας πεθαίνει.

Περίπου 1 στους 20 δεν αισθάνεται άνετα, έχει τοπικό ερεθισμό ή πυρετό. Περίπου 1 στους 50 έχει πυρετό.

Ιλαρά - ιδιαίτερα λοιμογόνος ιός που μεταδίδεται από σταγονίδια° προκαλεί πυρετό, βήχα, αναφυλαξία.

1 στα 25 παιδιά με ιλαρά αναπτύσσει πνευμονία και 1 στα 2.000 αναπτύσσει εγκεφαλίτιδα (ερεθισμό εγκεφάλου). Για κάθε 10 παιδιά που αναπτύσσουν εγκεφαλίτιδα, 1 πεθαίνει και μέχρι 4 έχουν μόνιμη ζημία εγκεφάλου. Περίπου 1 στα 25.000 αναπτύσσει SSPE (εκφυλισμό εγκεφάλου), που είναι πάντα θανατηφόρος.

Περίπου 1 στα 10 δεν αισθάνεται άνετα, έχει τοπικό ερεθισμό ή πυρετό. Περίπου 1 στα 100 αναπτύσσει αναφυλαξία, που είναι μη λοιμώδης. 1 στο 1 εκατομμύριο εμβολιασμένους μπορεί να αναπτύξει εγκεφαλίτιδα (ερεθισμό του εγκεφάλου).

Μηνιγγιτιδοκοκκικές λοιμώξεις - βακτηρίδια που μεταδίδονται από αναπνευστικά

Περίπου 1 στους 10 ασθενείς πεθαίνει. Από εκείνους που επιζούν, 1 στους 30 έχει

Περίπου 1 στους 10 έχει τοπικό ερεθισμό, πυρετό, οξυθυμία, προσωρινή απώλεια

<p>σταγονίδια. Προκαλούν σήψη (μόλυνση της κυκλοφορίας του αίματος) και μηνιγγίτιδα (μόλυνση των ιστών που περιβάλλουν τον εγκέφαλο).</p>	<p>σοβαρά σημάδια στο δέρμα ή απώλεια άκρων, και 1 στους 30 έχει σοβαρή εγκεφαλική ζημία.</p>	<p>όρεξης ή πονοκέφαλους.</p>
<p>Παρωτίτιδα - μεταδοτικός ιός που μεταδίδεται από το σάλιο° προκαλεί πρησμένους αδένες στο λαιμό, πυρετό.</p>	<p>1 στα 200 παιδιά αναπτύσσει εγκεφαλίτιδα (ερεθισμό εγκεφάλου). 1 στα 5 αγόρια μετά από την εφηβεία αναπτύσσει ερεθισμό των όρχεων. Περιστασιακά η παρωτίτιδα προκαλεί στειρότητα ή κώφωση.</p>	<p>1 στους 100 εμβολιασμένους μπορεί να αναπτύξει διόγκωση των σιελογόνων αδένων. 1 στα 3 εκατομμύρια εμβολιασμένων αναπτύσσει ήπια εγκεφαλίτιδα (ερεθισμό του εγκεφάλου).</p>
<p>Πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις - βακτηρίδια που μεταδίδονται από σταγονίδια° προκαλούν πυρετό, πνευμονία, σηψαιμία, μηνιγγίτιδα.</p>	<p>Περίπου 1 στους 10 ασθενείς μηνιγγίτιδας πεθαίνει.</p>	<p>Εμβόλιο πολυσακχαριτών: Λιγότερο από 1 στους 20 έχει πόνο ή τοπική αντίδραση. Συζευγμένο εμβόλιο: Περίπου 1 στους 10 έχει τοπική αντίδραση ή πυρετό.</p>
<p>Πολιομυελίτιδα - λοιμώδης ιός που μεταδίδεται από τα περιττώματα και το σάλιο° προκαλεί πυρετό, πονοκέφαλο, εμετό και μπορεί να προχωρήσει σε παράλυση.</p>	<p>Περίπου 1 στους 20 νοσηλευόμενους ασθενείς πεθαίνει και 1 στους 2 ασθενείς που επιζούν είναι μόνιμα παράλυτοι.</p>	<p>Είναι κοινή η τοπική κοκκινίλα (1 στους 3), πόνος (1 στους 7) και πρήξιμο (1 στους 10). Μέχρι 1 στους 10 έχει πυρετό, κλαίει και έχει μειωμένη όρεξη.</p>
<p>Ερυθρά - μεταδοτικός ιός που μεταδίδεται από σταγονίδια° προκαλεί αναφυλαξία, πυρετό, πρησμένους αδένες, αλλά προκαλεί σοβαρές δυσμορφίες στα μωρά των</p>	<p>Περίπου 5 στους 10 ασθενείς αναπτύσσουν φαγούρα και οδυνηρούς πρησμένους αδένες° 5 στους 10 εφήβους και ενηλίκους έχουν οδυνηρές κλειδώσεις° 1 στους</p>	<p>Περίπου 1 στους 10 δεν αισθάνεται άνετα, έχει τοπικό ερεθισμό, ή πυρετό. Περίπου 1 στους 20 έχει πρησμένους αδένες, δύσκαμπτο λαιμό, ή πόνους στις κλειδώσεις.</p>

μολυσμένων εγκύων γυναικών.

3.000 αναπτύσσει θρομβοκυτταροπενία (μωλωπτισμό ή αιμορραγία) ° 1 στους 6.000 αναπτύσσει ερεθισμό του εγκεφάλου ° 9 στα 10 μωρά που μολύνονται κατά τη διάρκεια των πρώτων 10 εβδομάδων μετά από τη σύλληψη θα έχουν μια σημαντική εκ γενετής ανωμαλία (όπως κώφωση, τύφλωση, εγκεφαλική ζημιά ή ανωμαλίες της καρδιάς).

Περίπου 1 στους 100 έχει αναφυλαξία, που είναι μημεταδοτική. Η θρομβοκυτταροπενία (μωλωπτισμός ή αιμορραγία) εμφανίζεται μετά από μια πρώτη δόση του MMR σε ένα ποσοστό 1 στους 30.500.

Τέτανος - προκαλείται από τοξίνη βακτηριδίων από το χώμα ° προκαλεί οδυνηρούς μυϊκούς σπασμούς, σπασμούς, κλείδωση των σιαγώνων.

Περίπου 1 στους 10 ασθενείς πεθαίνει. Ο κίνδυνος είναι μέγιστος για τα πολύ μικρά ή τους ηλικιωμένους.

Περίπου 1 στους 10 έχει τοπικό ερεθισμό ή πυρετό. Τα σοβαρά δυσμενή συμπτώματα είναι πολύ σπάνια.

Κοκκύτης - μεταδοτικά βακτηρίδια που μεταδίδονται από σταγονίδια ° προκαλεί ανεξέλεγκτο βήξιμο και εμετό, διαρκεί μέχρι τρεις μήνες.

Περίπου 1 στους 200 ασθενείς του κοκκύτη κάτω από ηλικία 6 μηνών πεθαίνει από πνευμονία ή εγκεφαλική ζημιά.

Περίπου 1 στους 10 έχει τοπικό ερεθισμό ή πυρετό. Τα σοβαρά δυσμενή συμπτώματα είναι πολύ σπάνια.